

¿Qué es la infección por Parvovirus Canino?

Esta enfermedad, llamada parvovirus canino (PVC), es una infección causada por un virus, es grave, sumamente contagiosa y afecta principalmente el tracto gastrointestinal de los cachorros, perros adultos y otros caninos salvajes. Ha sido identificada desde 1978 y tiene una distribución mundial.

¿Cómo se trasmite el Parvovirus Canino?

La enfermedad se trasmite por contacto cuando los cachorros y perros adultos ingieren el virus que se encuentra en la materia fecal proveniente de perros infectados. El virus es muy resistente a las condiciones ambientales extremas y puede sobrevivir por largos periodos de tiempo. Pequeñas cantidades de heces que contengan el virus pueden servir como reservorio de la infección y el virus es fácilmente transmitido de lugar a lugar transportado en el pelo o en los miembros del perro o en jaulas contaminadas, zapatos y otros objetos. La infección por parvovirus canino solamente puede ser transmitida a los perros y otros caninos y no a otro tipo de animales o al ser humano.



¿Cuáles perros tienen más riesgos?

Todos los perros que no han sido vacunados contra parvovirus canino tienen el riesgo de ser afectados, sin embargo, en los cachorros se aumenta el riesgo de adquirir la enfermedad entre el destete y los cuatro meses de edad. También ciertas razas parecen presentar un riesgo más alto en la severidad de la enfermedad (por ejemplo, los perros Rottweiler y el Doberman Pinscher).

¿Cuáles son los síntomas de la infección por Parvovirus?

Los primeros signos de la infección son depresión, pérdida del apetito, fiebre y diarrea severa sanguinolenta. Los perros pueden deshidratarse rápidamente debido al vomito y a la diarrea, y la mayoría de las muertes debido al virus de parvovirus ocurren dentro de las primeras 48 a 72 horas posteriores al inicio de los signos clínicos. Si su cachorro o perro adulto muestra alguno de estos síntomas comuníquese de inmediato con su Médico Veterinario.

¿Cómo se diagnostica y se trata la infección PVC?

Su Médico Veterinario hará el diagnóstico inicial de la enfermedad basándose en los signos clínicos y los análisis de laboratorio. No existen medicamentos específicos que maten al virus en animales infectados. El tratamiento de la infección debida a PVC debe iniciarse inmediatamente consistiendo en esfuerzos primarios para combatir la deshidratación reemplazando la pérdida de electrolitos y líquidos, controlando el vómito y la diarrea y previniendo las infecciones secundarias. Los perros enfermos deben mantenerse abrigados y con una buena alimentación, y deben separarse de otros perros. Es esencial la limpieza y desinfección de las perreras y otras áreas donde los perros se alojan para controlar la dispersión del virus.

¿Cómo se previene el Parvovirus?

La vacunación y la buena higiene son componentes de suma importancia en la prevención del parvovirus canino.

VACUNACIÓN— La vacunación es muy importante. Los cachorros pequeños son muy susceptibles a la infección, particularmente porque la inmunidad natural proveída en la leche materna disminuye antes de que el propio sistema inmune de los cachorritos madure lo suficiente para combatir la infección. Si un cachorrito



es expuesto al parvovirus canino durante este lapso de protección disminuida, puede llegar a enfermarse. Una preocupación adicional es que la inmunidad proveída por la leche materna puede interferir con una respuesta efectiva de vacunación. Esto significa que aun aunque los cachorritos hayan sido vacunados pueden sucumbir al parvovirus. Para disminuir esta falta de protección durante los primeros meses de vida y proveer adecuados niveles de seguridad en contra del parvovirus durante los primeros meses de vida, se recomienda administrar a los cachorritos una serie de vacunaciones que conferirán la protección adecuada.

Para proteger a sus perros adultos, los dueños deben de estar seguros que la vacunación por parvovirus debe estar vigente. Pregúntele a su Médico Veterinario acerca de la vacunación, la duración de la inmunidad y el programa más adecuado para su mascota.

HIGIENE — Hasta que el cachorrito haya recibido la serie completa de vacunaciones, los dueños deben ser muy precavidos y no deben permitir que su perrito tenga contacto con material fecal de otros cachorritos cuando camina en el parque, lugares de recreación, tiendas de mascotas, pruebas de obediencia, criaderos o pensiones, exposiciones caninas o cuando camina por las calles de la ciudad. Establecimientos con buena reputación y programas de entrenamiento reducen el riesgo a la exposición requiriendo programas de vacunación, examen de salud, buena higiene y el aislamiento de cachorritos y perros enfermos. Siempre se debe evitar el contacto con perros enfermos y sus alojamientos.

En resumen, no permita que su cachorrito o perro adulto tenga contacto con material fecal de otros perros cuando camina en el parque, lugares de recreo, o cuando camina en las calles de la ciudad. Siempre es recomendable disponer de una manera apropiada y con rapidez de las heces como una forma para limitar la propagación del parvovirus canino.

No obstante que este folleto le provea información básica acerca del Parvovirus Canino,

su Médico Veterinario siempre será la mejor fuente de información sobre la salud de su mascota. Consulte a su Médico Veterinario para mayor información acerca del parvovirus canino y su prevención.



Y Ahora, Una Nota Sobre La Buena Salud De Su Mascota

Solamente una mascota sana es un compañero feliz. Para asegurar que la vida diaria de su mascota sea saludable se requiere cuidado continuo y una esmerada atención cuidadosa para detectar cualquier indicio de enfermedad. Por ello La Asociación Americana de Medicina Veterinaria por lo tanto le recomienda que consulte a su Médico Veterinario en forma regular e inmediatamente si su mascota muestra alguno de los siguientes síntomas:

- **Hinchazones o inflamaciones anormales.**
- **Pérdida o ganancia marcada de peso.**
- **Cojeo, rigidez, o dificultad al levantarse o al echarse.**
- **Dificultad, decoloración, anormalidad o falta de control en las funciones fisiológicas para la excreción de orina y heces.**
- **Secreciones anormales por cualquiera de las aberturas naturales.**
- **Movimiento excesivo de la cabeza, rascarse, lamerse o morderse algunas partes de su propio cuerpo.**
- **Comportamiento anormal, cambios repentinos en la conducta como fatiga (dormir en exceso).**
- **Mal aliento o excesivo depósito de sarro en los dientes.**

Los exámenes físicos habituales son importantes. Las mascotas en comparación a las personas pueden desarrollar rápidamente condiciones de la enfermedad que suelen pasar desapercibidas aun cuando el dueño esté muy atento. Los Médicos Veterinarios están muy bien capacitados para detectar condiciones que se inician repentinamente mostrando síntomas leves. La detección temprana permite que los problemas sean atendidos fácilmente y resultan más económicos. Durante el examen físico de su mascota no dude en realizar cualquier pregunta. La colaboración entre el Médico Veterinario y el propietario de la mascota facilita tanto la detección temprana de las enfermedades, como la implementación del tratamiento adecuado permitiendo de igual forma el establecimiento de un programa regular de visitas.




American Veterinary Medical Association
1931 North Meacham Road, Suite 100
Schaumburg, Illinois 60173 - 4360
Phone: 847-925-8070
www.avma.org

Revised 5/03

Lo que usted debe saber acerca de

La infección por Parvovirus Canino



Cuidando Los Animales
Hoy • Mañana • Siempre